

Gebrauchsinformation: Information für Anwender**neo-angin – Pastillen**

Wirkstoffe: 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3-4 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind neo-angin – Pastillen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von neo-angin – Pastillen beachten?
3. Wie sind neo-angin – Pastillen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind neo-angin – Pastillen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind neo-angin – Pastillen und wofür werden sie angewendet?

neo-angin – Pastillen enthalten die Wirkstoffe 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol und Levomenthol. Bei neo-angin – Pastillen handelt es sich um ein antiseptisch wirkendes Arzneimittel für Mund und Rachen.

neo-angin - Pastillen werden angewendet zur Linderung und Verkürzung der Dauer der Beschwerden einer Entzündung der Rachenschleimhaut, einschließlich Halsschmerzen und Schluckbeschwerden.

Zur Anwendung bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.

Wenn sich die Symptome nach 3-4 Tagen nicht bessern oder gar schlechter werden, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von neo-angin – Pastillen beachten?**neo-angin – Pastillen dürfen nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie neo-angin – Pastillen anwenden.

Kinder

neo-angin – Pastillen dürfen nicht bei Kindern unter 6 Jahren angewendet werden. Für die Anwendung von neo-angin – Pastillen müssen Kinder das kontrollierte Lutschen von Pastillen beherrschen.

Anwendung von neo-angin – Pastillen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine hinreichenden Daten für die Anwendung von neo-angin – Pastillen bei Schwangeren und stillenden Müttern vor. Aufgrund fehlender Erfahrung wird die Anwendung von neo-angin – Pastillen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Es liegen keine Daten zum Einfluss auf die Fortpflanzungsfähigkeit vor.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es gibt keinen Hinweis für eine Auswirkung auf die Fähigkeit und das Bedienen von Maschinen. Entsprechende Studien wurden nicht durchgeführt.

neo-angin – Pastillen enthalten Cochenillerot A (E 124), Glucose, Saccharose, Schwefeldioxid, Sulfite und Natrium

neo-angin – Pastillen enthalten den Farbstoff Cochenillerot A (E 124), der allergische Reaktionen auslösen kann.

Dieses Arzneimittel enthält 1,14 g Glucose und 1,42 g Saccharose pro Pastille, was einem Kalorienwert von ca. 10 kcal (42 kJ) entspricht. Dies sollte bei Patienten mit Diabetes mellitus berücksichtigt werden.

Bitte wenden Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Der häufige und dauernde Gebrauch von neo-angin – Pastillen kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

Dieses Arzneimittel kann Schwefeldioxid oder Sulfite enthalten, die in seltenen Fällen schwere Überempfindlichkeitsreaktionen und Bronchospasmen hervorrufen können.

Der Farbstoff in diesem Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Pastille, d.h., sie ist nahezu „natriumfrei“.

3. Wie sind neo-angin – Pastillen anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Empfohlene Dosis für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren: alle 2-3 Stunden 1 Pastille (maximal 6 Pastillen pro 24 Stunden).

Dauer der Anwendung

neo-angin – Pastillen sollen nur zur kurzzeitigen Behandlung akuter Beschwerden eingesetzt und ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3-4 Tage angewendet werden.

Art der Anwendung

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum. Die Pastille langsam im Mund zergehen lassen. Um lokale

Irritationen der Mundschleimhaut zu vermeiden, sollen neo-angin - Pastillen, wie alle Lutschpastillen, während des AuflöSENS im Mund bewegt werden.

Wenn Sie eine größere Menge von neo-angin – Pastillen angewendet haben, als Sie sollten

Bislang ist kein Fall einer Überdosierung bekannt. Im unwahrscheinlichen Fall einer Überdosierung könnten die beschriebenen Nebenwirkungen verstärkt auftreten. In diesem Fall wird eine symptomatische Behandlung empfohlen.

Wenn Sie die Anwendung von neo-angin – Pastillen vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Setzen Sie die Anwendung wie gewohnt fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen an sich bemerken, stoppen Sie sofort die Anwendung von neo-angin – Pastillen und wenden Sie sich an einen Arzt.

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen): Reizung der Mund- und Magenschleimhaut, wie zum Beispiel Verdauungsstörungen (Dyspepsie), Übelkeit.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar): Allergische Reaktionen, wie zum Beispiel Schwellungen an Mund, Zunge und Lippen, Ausschlag.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind neo-angin – Pastillen aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie

das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was neo-angin – Pastillen enthält

- Die Wirkstoffe sind:
2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol

Eine Pastille enthält:	
2,4-Dichlorbenzylalkohol	1,20 mg
Levomenthol	5,90 mg
Amylmetacresol	0,60 mg

- Die sonstigen Bestandteile sind:
Glucosesirup
Saccharose
Sternanisöl
Pfefferminzöl
Weinsäure
Cochenillerot A (E 124), enthält Natrium

Wie neo-angin – Pastillen aussehen und Inhalt der Packung

Runde, rote, leicht bikonvexe, schwach transparente Pastillen in einer Aluminiumblisterpackung aus PVC/PVDC zu 24 und 48 Stück.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber

M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH, Doerenkampgasse 11, A 1100 Wien
Tel.: +43 1 688 21 61
Fax: +43 1 688 21 61 27
Email: office@klosterfrau.at

Hersteller

Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Straße 41, 12277 Berlin
Deutschland

Z.Nr.: 13.315

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2025.