

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Padma Immun Kapseln

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 4 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Padma Immun und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Padma Immun beachten?
3. Wie ist Padma Immun einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Padma Immun aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Padma Immun und wofür wird es angewendet?

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel unterstützend

- zur Stärkung des Immunsystems
- zur Vorbeugung wiederkehrender Erkältungskrankheiten und Infektionen der oberen Atemwege
- Reduzierung der Infekthäufigkeit

Dieses Arzneimittel ist eine traditionelle pflanzliche Arzneispezialität, die ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für die genannten Anwendungsgebiete registriert ist.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.

Wenn Sie sich nach 4 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Padma Immun beachten?

Padma Immun darf nicht eingenommen werden,

wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen einen der Wirkstoffe, gegen Vertreter aus der Familie der Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, wenn diese mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen, darf Padma Immun nicht angewendet werden. Die Kapseln dürfen nicht geöffnet werden. Die Inhalation von Padma Immun-Pulver kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Padma Immun einnehmen.

Wenn Fieber, Atemnot, blutiger oder eitrigter Auswurf auftritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Einnahme von Padma Immun zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.
Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

3. Wie ist Padma Immun einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Erwachsene ab 18 Jahren:

Als Anfangsdosis 3 × 2 Kapseln täglich, nach Besserung 2 x 2 Kapseln täglich

Jugendliche von 12 bis 18 Jahren:

2 × 2 Kapseln täglich

Kinder von 6 bis 11 Jahren:

3 × 1 Kapsel täglich

Anwendung bei Kindern

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Padma Immun soll vor oder zu den Mahlzeiten eingenommen werden.

Wenn Beschwerden im Magen-Darm-Bereich auftreten, können die Kapseln zu den Mahlzeiten mit viel Flüssigkeit (am besten lauwarmem Wasser) eingenommen werden.

Personen mit Schluckbeschwerden können den Kapselinhalt in lauwarmem Wasser auflösen (ausgenommen Patienten mit Asthma bronchiale oder einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege – siehe Abschnitt **Was sollten Sie vor der Einnahme von Padma Immun beachten.**).

Zwischen der Einnahme von Padma Immun und weiteren Arzneimitteln soll ein Abstand von eineinhalb bis zwei Stunden eingehalten werden.

Dauer der Anwendung:

Padma Immun soll mindestens über einen Zeitraum von 4 Wochen angewendet werden.

Wenn Sie sich nach 4 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von Padma Immun eingenommen haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Padma Immun vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentliche Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

- Beschwerden im Magen-Darm-Bereich (Verdauungsbeschwerden, Übelkeit, Sodbrennen, Durchfall)
- Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschläge und Juckreiz

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das folgende nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Padma Immun aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ bzw. auf der Blisterpackung nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Die Chargennummer bzw. Chargenbezeichnung wird nach der Abkürzung „Lot.“ angeführt.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Padma Immun enthält

- Die Wirkstoffe sind:
 - 40 mg Himalayaschartenwurzel
 - 40 mg Isländisches Moos
 - 35 mg Nimbaumfrüchte,
 - 30 mg Kardamomenfrüchte
 - 30 mg Myrobalanenfrüchte
 - 30 mg Rotes Sandelholz
 - 25 mg Nelkenpfeffer
 - 20 mg Marmelosfrüchte
 - 20 mg Calciumsulfat Hemihydrat
 - 15 mg Akeleikraut
 - 15 mg Süssholzwurzel
 - 15 mg Spitzwegerichblätter
 - 15 mg Vogelknöterichkraut
 - 15 mg Gold-Fingerkraut
 - 12 mg Gewürznelken
 - 10 mg Kaempferia-galanga-Rhizom
 - 10 mg Sidakraut
 - 10 mg Baldrianwurzel
 - 6 mg Gartenlattichblätter
 - 5 mg Ringelblumenblütenköpfchen
 - 4 mg D-Campher

- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Hochdisperses Siliciumdioxid (Kapselinhalt), Gelatine (Kapselhülle)

Wie Padma Immun aussieht und Inhalt der Packung

Transparente, farblose Hartkapseln mit braunem Inhalt bestehend aus helleren und dunkleren Partikeln in Aluminium-PVC/PVdC-Blisterpackungen.

Packungen zu 100 und 200 Stück.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG
Wolfganggasse 45 – 47
AT-1121 Wien

Reg.Nr.: 742148

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2025.